

## LIQUACEF® C

Polvo con Diluyente



### Composición

Cefpodoxime proxetil 10 mg  
Clavulánico, ácido 6.25 mg

### Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones cutáneas (heridas y abscesos) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis y otras infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras causadas por gérmenes sensibles al cefpodoxime.

### Dosis

Preparación: Añada agua hasta la marca del frasco y agite, ya reconstituído, cada mL contiene 10 mg de cefpodoxime (como proxetil) y 6.25 mg de ácido clavulánico (como sal potásica). Deje reposar durante 5 minutos para asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL por cada 1-2 kg (5-10 mg de cefpodoxime/Kg ) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días luego de la remisión de síntomas clínicos. Gatos: 1 mL por cada 2Kg (5 mg de cefpodoxime/kg) cada 12 horas o 1 mL por Kg (10 mg de cefpodoxime/kg) cada 24 horas hasta 3 días luego de la resolución del cuadro. Debe almacenarse en refrigeración (entre 2°C y 8°C) y puede utilizarse hasta por 7 días.

### Presentaciones

Frasco 11 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA SENASA Peru: F.82.70.I.0144

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01D OTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTAMICOS  
QJ01DD Cefalosporinas de tercera generación  
QJ01DD13 cefpodoxim

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
B-lactámicos  
Cefalosporinas  
Asociados a otros antibióticos y otros medicamentos

### Web Site

<https://www.agrovvetmarket.com/productos-veterinarios/liquacef-antibiotico-cefalosporinico-inhibidor-resistencia-bacteriana>

Agrovvet Market Animal Health

