

## OTIDERMA-CEF®

Suspensión Ótica



### Composición

Cefalexina, monohidrato 2 g  
Dexametasona, (21) fosfato sódica 7.5 mg  
Gentamicina 1 g  
Vitamina A palmitato 100000 U.I.

### Indicaciones

Para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica, dermatitis, piodermas, laceraciones, abrasiones, heridas o cuando se necesite reducción de la inflamación y el dolor. Con la adición de dexametasona y vitamina A reduce las consecuencias del proceso infeccioso y participa manteniendo la integridad de los tejidos respectivamente.

### Dosis

Para tratar otitis externa y otras condiciones inflamatorias del oído externo, llenar el canal auditivo externo con una cantidad suficiente hasta completar el área tratada. En piel o membranas mucosas, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión, distribuir o frotar suavemente. El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al día, dependiendo del criterio del médico veterinario.

### Presentaciones

Jeringa 15 mL,

### Vías Administración

Topical Ótica  
Topical Dérmico

### Países

Ecuador AGROCALIDAD 2C4-12974  
Guatemala MAGA PE200-41-06-1489  
México SAGARPA Q-0616-010  
Nicaragua MAGFOR 8803  
Panamá MIDA RF-5678-11  
Perú SENASA F.71.03.N.0014  
República Dominicana MAG 6599

### Clase ACTVET

QD DERMATOLÓGICOS  
QD06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO  
QD06A ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO  
QD06AX Otros antibióticos para uso tópico  
QD06AX99 otros antibióticos para uso tópicos, combinaciones

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
Aminoglucosidos  
B-lactámicos  
Cefalosporinas  
Asociados a otros antibióticos y otros medicamentos  
Antibióticos de uso específico solo a asociados  
Dérmicos  
Óticos

Agrovvet Market Animal Health

