OTIDERMA-CEF®

Agrovet Market Animal Health

Suspensión Ótica





Composición

Cefalexina, monohidrato 2 g
Dexametasona, (21) fosfato sódica 7.5 mg
Gentamicina 1 g
Vitamina A palmitato 100000 U.I.

Indicaciones

Para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica, dermatitis, piodermas, laceraciones, abrasiones, heridas o cuando se necesite reducción de la inflamación y el dolor. Con la adición de dexametasona y vitamina A reduce las consecuencias del proceso infeccioso y participa manteniendo la integridad de los tejidos respectivamente.

Dosis

Para tratar otitis externa y otras condiciones inflamatorias del oído externo, llenar el canal auditivo externo con una cantidad suficiente hasta completar el área tratada. En piel o membranas mucosas, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión, distribuir o frotar suavemente. El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al día, dependiendo del criterio del médico veterinario.

Presentaciones

Jeringa 15 mL,

Vias Administración

Topical Ótica
Topical Dérmico

Paises

Ecuador AGROCALIDAD 2C4-12974
Guatemala MAGA PE200-41-06-1489
México SAGARPA Q-0616-010
Nicaragua MAGFOR 8803
Panamá MIDA RF-5678-11
Perú SENASA F.71.03.N.0014
República Dominicana MAG 6599

Clase ACTVET

QD DERMATOLÓGICOS
QD06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO
QD06A ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO
QD06AX Otros antibióticos para uso tópico
QD06AX99 otros antibióticos para uso tópicos, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Aminoglucosidos
B-lactamicos
Cefalosporinas
Asociados a otros antibióticos y otros medicamentos
Antibióticos de uso especifico solo a asociados
Dérmicos
Oticos

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com