

PORCIMUTIN® C80 PX

Premix



Composición

Neomicina, sulfato 15 g
Tetraciclina clorhidrato 7 g
Tiamulina, fumarato hidrogenado 80 g
Vitamina A 400000 U.I.
Vitamina B12 0.6 mg
Vitamina D3 (Colecalciferol) 60000 U.I.
Vitamina E (a-tocoferol) 200 U.I.
Vitamina K3 (Menadiona) 200 mg

Indicaciones

Tratamiento, prevención y/o control de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tiamulina. Cerdos: Disentería porcina Colitis porcina, Enteropatía proliferativa porcina, neumonía enzoótica micoplasmótica, y pleuroneumonía. Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa. Coriza. Enfermedades ocasionadas por Streptococcus spp. y Clostridium perfringens. Conejos: Enterocolitis epizoótica (EEC).

Dosis

Promotor de crecimiento y producción: 12.5 – 25 g/TM kg alimento. Preventiva: 37.5-62.5 g /TM kg alimento.
Terapéutica: Cerdos: 125 – 250 g/TM kg alimento/diario por 5 - 10 días. Aves: 312.5 – 625 g /TM kg alimento/diario por 3 - 5 días. Conejos: 50 g/TM kg alimento/diario por 3 - 5 días.

Presentaciones

Sobre 15 g, Caja 20 kg, Caja 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01X OTROS ANTIBACTERIANOS
QJ01XQ Pleuromutilinas
QJ01XQ01 tiamulina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Otros antibióticos

Web Site

Agrovet Market Animal Health

