

TYLAMOX® WS

Polvo Soluble



Composición

Amoxicilina, trihidrato 10 g
Tilosina, tartrato 50 g

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles: infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urogenital e infecciones de piel y tejidos blandos y prevención de infecciones bacterianas secundarias. Aves: ERC y otras respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, enteritis necrótica, estafilo/estreptococosis, coriza, onfalitis e infección del saco vitelino, saculitis, sinusitis, sinovitis, dermatitis Cerdos: Neumonía enzoótica y otras respiratorias, disentería, rinitis atrófica, enfermedad del edema, colibacilosis, salmonelosis, diarreas, corinebacteriosis, erisipelosis, leptospirosis, dermatitis, otras. Preruminantes: infecciones respiratorias, entéricas y diarreas, enterotoxemia.

Dosis

Por 3 a 5 días: Aves: Preventivo: 1kg/2,000 L de agua (o en 1,000 kg de alimento). Preventivo de micoplasmosis y terapéutico: 1 Kg/1,000 L de agua (o en 500 kg de alimento). Cerdos: Preventivo: 1kg/4,000 L de agua (o en 2,000 kg de alimento). Terapéutico: 1 Kg/2000-4000 L de agua (o en 1,000-2,000 kg de alimento). Terneros, corderos, caprinos y camélidos jóvenes: Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 Kg/vez (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

Presentaciones

Pote 1 kg, Pote 500 g, Pote 100 g, Envase 15 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01F MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y STREPTOGRAMINAS
QJ01FA Macrolidos
QJ01FA90 tilosina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
B-lactamicos
Penicilinas
Macrolidos

Web Site

Agrovet Market Animal Health

