TYLODOX® WS

Agrovet Market Animal Health

Polvo Soluble





Composición

Doxiciclina, hiclato 10 g
Tilosina, tartrato 10 g

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina y/o doxicilina. Entre ellas: infecciones del aparato respiratorio, digestivo y urogenital tales como: micoplasmosis, ERC, coriza, colibacilosis, onfalitis e infección del saco vitelino, cólera aviar, enteritis y diarrea, enteritis necrótica, saculitis, sinusitis, sinovitis, estafilococosis, estreptococosis, corinebacteriosis, hexamitiasis, leptospirosis entre otras. Prevención de infecciones bacterianas secundarias consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés, vacunaciones, realojamiento, corte de pico, transporte, cambios de alimentación y clima.

Dosis

Aves y cerdos: Preventivo: 1 kg / 2,000 L de agua (o en 1,000 kg de alimento) durante 3-5 días. Tratamiento: 1kg/1,000-1,500 L agua (o en 500-750kg de alimento) durante 3-5 días. Terneros, corderos, caprinos y camélidos jóvenes: Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 Kg/vez por 3-5 días (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

Presentaciones

Pote 1 kg, Pote 500 g, Pote 100 g, Sobre 15 g,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01R COMBINACIÓN DE ANTIBACTERIANOS
QJ01RA Combinacion de antibacterianos
QJ01RA91 macrólidos, combinaciones con otros antibacterianos

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Macrolidos
Tetracilinas

Web Site

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com