

## TYLODOX® WS

Polvo Soluble



### Composición

Doxiciclina, hclato 10 g  
Tilosina, tartrato 10 g

### Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina y/o doxicilina. Entre ellas: infecciones del aparato respiratorio, digestivo y urogenital tales como: micoplasmosis, ERC, coriza, colibacilosis, onfalitis e infección del saco vitelino, cólera aviar, enteritis y diarrea, enteritis necrótica, saculitis, sinusitis, sinovitis, estafilococosis, estreptococosis, corinebacteriosis, hexamitiasis, leptospirosis entre otras. Prevención de infecciones bacterianas secundarias consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés, vacunaciones, realojamiento, corte de pico, transporte, cambios de alimentación y clima.

### Dosis

Aves y cerdos: Preventivo: 1 kg / 2,000 L de agua (o en 1,000 kg de alimento) durante 3-5 días. Tratamiento: 1kg/1,000-1,500 L agua (o en 500-750kg de alimento) durante 3-5 días.

Terneros, corderos, caprinos y camelídos jóvenes:

Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 Kg/vez por 3-5 días (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

### Presentaciones

Pote 1 kg, Pote 500 g, Pote 100 g, Sobre 15 g,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01R COMBINACIÓN DE ANTIBACTERIANOS  
QJ01RA Combinacion de antibacterianos  
QJ01RA91 macrólidos, combinaciones con otros antibacterianos

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)  
Macrolídos  
Tetracilinas

### Web Site

## Agrovet Market Animal Health

