

TYLVAX® WS

Polvo Soluble





Composición

Tilvalosina, tartrato 25 g

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina. Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), Enteritis necrótica, enteritis bacterianas e infecciones por Ornithobacterium rhinotracheale. Cerdos: Neumonía micoplásmica (enzoótica), ileítis porcina, disentería porcina y colitis Porcina

Dosis

Aves: Preventivo: 80-100 g/200 L agua (3 primeros días de vida) y 40-60 g/200 L agua (3-4 días más o en situaciones de stress posteriores. Terapéutico: 80-100 g/200 L agua por 3 días. Cerdos: Preventivo: 100g /500 L por 3-4 días. Terapéutico. Ileítis (EPP): 100 g /500 L agua por5 días. Demás patologías: 100-200 g /500 L agua por 3-5 días.

Presentaciones

Pote 1 kg, Pote 500 g, Pote 100 g, Sobre 15 g,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO QJ01F MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y STREPTOGRAMINAS QJ01FA Macrolidos QJ01FA92 tilvalosina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos) Macrolidos

Web Site

Agrovet Market Animal Health



