

ULTRAMETRIN® 600

Concentrado Emulsionable



Composición

Cipermetrina 10 g
Etióón 40 g
Piperonilo, butóxido 10 g

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de la garrapata común del bovino y otras especies de garrapatas. Contra insectos picadores, ácaros, piojos, pulgas, entre otros. Su acción residual es de hasta 4 semanas.

Dosis

Para baños de inmersión: pie de baño: 1 L/1000 L de agua dulce o salobre. Reposición y refuerzo: 1.5 L/1000 L de agua, se realizarán ambas operaciones cuando el nivel del bañadero descienda en un 10% de su capacidad. Refuerzo en seco: 0.5 L/1000 L de agua que descienda el bañadero, esto se realiza para no reponer el agua consumida. Para aspersion de animales: 1 L/1000 L de agua (aplicar la emulsión final por aspersion usando 1 L/animal aproximadamente). Para pulverización en locales e instalaciones: 1 mL/1 a 2 L de agua (1 L de la emulsión final por 10 a 15 m² de superficie a tratar).

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 20 mL,

Vias Administración

Topical Dérmico

Países

Ecuador AGROCALIDAD 3B1-B2-B3-11640
Guatemala MAGA PE69-43-02-461
Honduras SAG IP-527
Nicaragua MAGFOR 8815
Panamá MIDA RQ-207-06
Perú SENASA F.07.08.N.0327
República Dominicana MAG 6207

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53A ECTOPARASITICIDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS
QP53AC Piretrinas y piretroides
QP53AC08 cipermetrina

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Reguladores del crecimiento (larvas/huevos)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

Agrovvet Market Animal Health

