

VENTOCARDYL®

Solución Inyectable



Composición

Diprofilina (difilina) 10 g
Heptaminol, clorhidrato 10 g

Indicaciones

Para casos de mal de altura, reanimación de recién nacidos, para revertir los efectos de neurolépticos y otros anestésicos, tos cardíaca, colapso, falla cardíaca, isquemia miocárdica, deficiencia circulatoria, hipotensión, miocarditis, insuficiencia venosa, astenia, cansancio y como desfatigante no específico. Como broncodilatador, indicado en casos de enfermedad obstructiva de las vías aéreas (cuando es reversible). Tratamiento concomitante en desórdenes del tracto respiratorio, disnea (asociada a la congestión y el edema de pulmón, como terapia adicional), edema pulmonar.

Dosis

Dosis: 1 mL/10 kg de p.v., de ser necesario, puede repetirse cada 4-5 horas, hasta por 4-5 días. Aplicar vía intravenosa, intramuscular o intraperitoneal.

Presentaciones

Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intraperitoneal

Países

Bolivia SENASAG 003828
Costa Rica SENASA MAG PE10-50-02-4126
Ecuador AGROCALIDAD 6A-11843
El Salvador MAG 2007-12-3682
Guatemala MAGA PE241-50-02 -1871
Perú SENASA F.11.01.N.0008

Clase ACTVET

QC SISTEMA CARDIOVASCULAR
QC01 TERAPIA CARDIACA
QC01D VASODILATADORES USADOS EN ENFERMEDADES CARDIACAS
QC01DX Otros vasodilatadores usados en enfermedades cardíacas
QC01DX08 heptaminol

Clases Farmacoterapéuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Cardiacos – circulatorios
Respiratorios

Web Site

<http://agrovetmarket.com/productos-veterinarios/ventocardyl-heptaminol-diprofilina-analeptico-cardiorespiratorio>

Agrovet Market Animal Health

