

BIOMEC® 100 L.A

Suspensión Inyectable



Composición

Ivermectina 1 g

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de ectoparásitos y endoparásitos en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos. Ectoparásitos Miasis cutánea: *Cochliomyia hominivorax* (gusano tornillo), miasis subcutánea: *Dermatobia hominis* (tupe, nuche, ampiri, boro), miasis cavitaria nasal: *Oestrus ovis*, *Haematobia irritans*, *Hypoderma* sp. Garrapatas: *R. microplus*. Acaros de la sarna: *Psoroptes* sp., *Sarcoptes* sp. y *Chorioptes* sp. Piojos chupadores: *Haematopinus* sp., *Linognathus* sp., *Solenopotes capillatus*. Endoparásitos Nemátodos gastrointestinales (inmaduros y adultos): *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Cooperia* sp., *Trichostrongylus* sp., *Ascaris suum*, *Oesophagostomum* sp., *Haemonchus contortus*, *Metastrongylus* sp., *Nematodirus* sp., *Ostertagia* sp., *Cooperia* sp., *Trichuris* sp., *Strongyloides* sp., *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Stephanurus dentatus* (larvas), *Chabertia ovina* (adulto), *Bunostomum* sp y *Trichinella spiralis* (fase intestinal). Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria* y *Dictyocaulus viviparus*.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1 mL por 50 Kg de p.v. Porcinos: 1.5 mL por 50 de p.v. Dosis única
Período de Retiro: Carne: 42 días. No administrar a hembras en lactación

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.09.01.N.071

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

<https://www.biomont.com.pe/~/media/antiparasitarios/biomec-100-l-a/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

