

BIOMEC 120 L.A. DORADO®

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1200 mg

Indicaciones

Para tratamiento y control de ECTOPARASITOS: Miasis cutánea: *Cochliomyia hominivorax* (gusano tornillo), Miasis subcutánea: *Dermatobia hominis* (tupe, nuche, ampiri, boro), Miasis cavitaria Nasal: *Oestrus ovis* (fases larvales), *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos); *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*. Control de infestaciones por Garrapatas: *Boophilus microplus*. Acaros de la sarna: *Psoroptes*, *Sarcoptes* y *Chorioptes*. Piojos chupadores: *Haematopinus suis*, *H. eurysternus*, *Linognathus vituli*, *L. pedalis*, *Solenopotes capillatus*. ENDOPARASITOS: Nemátodos Gastrointestinales: *Haemonchus*, *Ostertagia* o *L4*), *Cooperia*, *Trichostrongylus*, *Strongyloides*, *Ascaris suum*, *Bunostomum*, *Nematodirus*, *Trichuris*, *Oesophagostomum*, *Metastrongylus*, y fases intestinales de *Trichinella spiralis*, *Stephanurus dentatus*, *Graphinema aucheniae*, *Lamanema chavezii*, *Nematodirus spathiger*, *N. lamae*, adulto de *Chabertia ovina*. Larva *Haemonchus contortus* y *Ostertagia circumcincta*. Nemátodos Pulmonares: *Dictyocaulus filaria* y *Dyctyocaulus viviparus*

Dosis

Vacunos, Ovinos, Caprinos: 1 mL/ 60 kg P.V. Camélidos Sudamericanos: 1 mL/ 60 kg P.V. Porcinos: 1.5 mL/ 60 kg. Período de retiro: Carne 42 días. No administrar en vacas en período de lactación, ni 42 días antes del parto.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.09.01.N.054

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/biomec-120-la/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

