

BIOMEC® ADE

Suspensión Inyectable



Composición

Ivermectina 1 g
Vitamina A (retinol acetato) 5000000 U.I.
Vitamina D3 (Colecalciferol) 750000 U.I.
Vitamina E (a-tocoferol) 500 U.I.

Indicaciones

Está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos para el tratamiento y control de endoparásitos y ectoparásitos. Ectoparásitos Miasis cutánea: *Cochliomyia hominivorax* (gusano tornillo), miasis subcutánea: *Dermatobia hominis* (tupe, nuche), miasis cavitaria nasal: *Oestrus ovis*, *Haematobia irritans*, *Hypoderma* sp. Garrapatas: *R. microplus*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes* sp., *Sarcoptes* sp. y *Chorioptes* sp. Piojos chupadores: *Haematopinus* sp., *Linognathus* sp., *Solenopotes capillatus*. Endoparásitos Nematodos gastrointestinales (inmaduros y adultos): *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Cooperia* sp., *Trichostrongylus* sp., *Strongyloides* sp., *Ascaris suum*, *Nematodirus* sp., *Trichuris* sp., *Bunostomum* sp. *Oesophagostomum* sp., *Graphinema aucheniae*, *Lamanema chavezi*, *Haemonchus contortus*, *Metastrongylus* sp., *Stephanurus dentatus*, *Ostertagia circumcincta* (larvas), *Chabertia ovina*, *trichinella spiralis*. Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria* y *Dictyocaulus viviparus*. Por su asociación con vitamina A, vitamina D3, vitamina E, se favorece la pronta y mejor recuperación del animal.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, sudamericanos: 1 mL por 50 kg de p.v. Porcinos: 1.5 mL por 50 Kg de p.v. No requiere período de retiro.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.96.01.N.0004

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

