BIOMISIL® 1 %

Biomont,

Solución Inyectable





Composición

Ivermectina 1 g



Indicaciones

Tratamiento y control de Ectoparasitos: Miasis cutánea: Cochliomyia hominivorax (gusano tornillo), Miasis subcutánea: Dermatobia hominis (tupe, nuche), Miasis Cavitaria Nasal: Oestrus ovis (fases larvales), Haematobia irritans (mosca de los cuernos); Hypoderma bovis, H. lineatum. Infestaciones por Garrapatas: Boophilus microplus. Ácaros de sarna: Psoroptes, Sarcoptes y Chorioptes. Piojos chupadores: Haematopinus suis, H. eurysternus, Linognathus vituli, L. pedalis, Solenopotes capillatus. Endoparasitos: Nemátodes gastrointestinales adultos y cuarta fase larvaria de Haemonchus, Ostertagia (L4 inhibida o hipobiótica), Trichostrongylus (T. axei), Strongyloides, Bunostomum, Trichuris, Cooperia, Nematodirus (N. vatus), Oesophagostmum, forma adulta de Chabertia ovina. Lamanema chavezi. Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Metastrongylus, Stephanurus dentatus y fase intestinal (no muscular) Trichinella spiralis. H. contortus y O. circumcincta. Nemátodes Pulmonares: Dictyocaulus.

Dosis

Vacunos, Ovinos y Caprinos: 1 mL/50 kg P.V. Camélidos sudamericanos: 1 mL/50 kg P.V. Porcinos: 1.5 mL / 50 kg P.V. Período de retiro: Carne: 21 días. No usar en ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Subcutáneo

Paises

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/biomisil-1/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com