

BUTADIONE®

Solución Inyectable



Composición

Fenilbutazona 20 g

Indicaciones

Está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos, caninos y felinos como antiinflamatorio no esteroideo con efecto analgésico, antipirético y antirreumático, para el tratamiento de procesos traumáticos e inflamatorios de origen no infeccioso que afectan al sistema músculo-esquelético. Utilizado en casos de laminitis, artritis reumática, miositis, artrosis, tendovaginitis, espondiloartrosis, periostitis, torceduras, lesiones musculares, fracturas, contusiones, tendinitis, sinovitis, bursitis, distensiones, luxaciones y otras patologías inflamatorias.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1 mL/50 kg de p.v. (equivalente a 4 mg de fenilbutazona/kg de p.v.) cada 24 horas según la indicación del Médico Veterinario.
Equinos: 1.5 a 3 mL/100kg de p.v. (equivalente a 3-6 mg de fenilbutazona/kg de p.v.) cada 12 horas según la indicación del Médico Veterinario. (No exceder de 8.8 mg fenilbutazona/kg de p.v. al día) Caninos y felinos: 2.2 mL/10 kg de p.v. (equivalente a 44 mg de fenilbutazona/kg de p.v.) por día dividido en 2 a 3 dosis cada 12 u 8 horas según la indicación del Médico Veterinario. (No exceder de 800 mg fenilbutazona al día) Período de Retiro: Carne: 40 días

Presentaciones

Frasco 100 mL,

Vías Administración

Parenteral Intravenoso

Países

Perú SENASA F.99.01.N.0044

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiinflamatorios
No esteroideos sistémicos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/otros/butadione/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

