

## BUTADIONE®

### Solución Inyectable



### Composición

Fenilbutazona 20 g

### Indicaciones

Está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos, caninos y felinos como antiinflamatorio no esteroideo con efecto analgésico, antipirético y antirreumático, para el tratamiento de procesos traumáticos e inflamatorios de origen no infeccioso que afectan al sistema músculo-esquelético. Utilizado en casos de laminitis, artritis reumática, miositis, artrosis, tendovaginitis, espondiloartrosis, periostitis, torceduras, lesiones musculares, fracturas, contusiones, tendinitis, sinovitis, bursitis, distensiones, luxaciones y otras patologías inflamatorias.

### Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1 mL/50 kg de p.v. (equivalente a 4 mg de fenilbutazona/kg de p.v.) cada 24 horas según la indicación del Médico Veterinario. Equinos: 1.5 a 3 mL/100kg de p.v. (equivalente a 3-6 mg de fenilbutazona/kg de p.v.) cada 12 horas según la indicación del Médico Veterinario. (No exceder de 8.8 mg fenilbutazona/kg de p.v. al día) Caninos y felinos: 2.2 mL/10 kg de p.v. (equivalente a 44 mg de fenilbutazona/kg de p.v.) por día dividido en 2 a 3 dosis cada 12 u 8 horas según la indicación del Médico Veterinario. (No exceder de 800 mg fenilbutazona al día) Período de Retiro: Carne: 40 días

### Presentaciones

Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intravenoso

### Países

Perú SENASA F.99.01.N.0044

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiinflamatorios  
No esteroidales sistémicos

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/otros/butadione/>

Biomont,

