

## CONTROL® 200

Solución Tópica



### Composición

Cipermetrina 20 g

### Indicaciones

Indicado para el control de estoparásitos, como la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*), piojos chupadores y masticadores (*Haematopinus* sp., *Linognathus vituli*), garrapatas (*Rhipicephalus microplus*, *Rhipicephalus sanguineus*), falsa garrapata del ganado ovino (*Melophagus ovinus*), pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y ácaros causantes de la sarna (*Sarcoptes* sp., *Psoroptes* sp., *Chorioptes* sp., *Demodex* sp.).

### Dosis

Para baños de inmersión: Diluir 1 L de Control 200 por cada 1000 litros de agua. Utilizar en la reposición 1.5 L de Control 200 por cada 1000 L de agua. Para baños por aspersión: Diluir 20 mL de Control 200 por cada 10 L de agua. Utilizar 5 L de la solución preparada para un bovino adulto. Aplicar en sentido contrario al pelo para que el producto penetre y se fije. Para fumigación: Diluir entre 20 mL - 40 mL de Control 200 por cada 2 L de agua. Repetir la fumigación a los 21 días. Posteriormente repetir cada 30 días o más, según la especie del ectoparásito. Período de Retiro: Carne: 2 días y Leche: 2 días.

### Presentaciones

Frasco 20 mL,

### Vías Administración

Topical Dérmico

### Países

Perú SENASA F.07.08.N.0198

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios De Uso Externo  
Acaricidas  
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)  
Garrapatas  
Piojos

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/control-200/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

