GIGANTOL® ADE

Biomont,

Solución Inyectable





Composición

Vitamina A 50000000 U.I.
Vitamina D3 (Colecalciferol) 7500000 U.I.
Vitamina E (a-tocoferol) 5000 U.I.

Indicaciones

Esta indicado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, caninos, felinos y aves para el tratamiento y prevención de afecciones causadas por estados carenciales de vitaminas A, D3 y E. En caso de requerimientos especiales tales como épocas de lactancia, gestación, cría, y producción de carne: trastornos nutricionales como debilidad en neonatos, osteomalacia, pérdida de peso, anorexia, raquitismo y distrofia muscular (enfermedad del músculo blanco); trastornos reproductivos como la prevención de retención de placenta y abortos. Indicado en periodos de estrés (como cambios bruscos de temperatura, cambios de alimentación, transporte, trabajo, vacunación, desparacitaciones) así como en alteraciones oculares (conjuntivitis, xeroftalmia, ceguera nocturna). Formulado especialmente para ser administrado por vía intramuscular y oral.

Dosis

Bovinos: Terneros: 0.5-2 mL. Adultos: 3-5 mL. (Intramuscular) Equinos: Potros: 3-5 mL. Adultos: 0.5-2 ml (Intramuscular) Camélidos sudamericanos: Tuis: 0.25-0.5 mL. Adultos: 0.5-1 mL. (Intramuscular) Ovinos: Cordero: 0.25-0.5 mL. Adulto:0.5-1 mL. (subcutáneo) Caprinos: Adulto:2-3 mL. Cabrito: 0.25-0.5 mL. (subcutáneo) Porcinos: Adulto: 2-3 mL. Lechón: 0.25-0.5 mL. (intramuscular) Caninos: 0.25-1 mL.(intramuscular) Felinos: 0.25-1 mL.(intramuscular) Aves: 10-20 mL/1000 L (oral) No requiere período de retiro.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vias Administración

Oral
Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.75.01.N.0118

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Inmunidad
Metabolismo y hepáticos
Musculares
Reconstituyentes
Vitaminas
Solas

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com