

LACTABIEN®

Suspensión Intramamaria



Composición

Cefalexina Sodica 200 mg
Sulfametoxazol 200 mg
Trimetoprim 40 mg
Vitamina A 20 mg

Indicaciones

Lactabien posee en su fórmula, la asociación de Cefalexina, Sulfametoxazol y Trimetoprim; antibióticos cuya capacidad antibacteriana es de amplio espectro. La Vitamina A presente en su composición favorece la regeneración epitelial de la glándula mamaria. Está indicado específicamente para los casos de mastitis clínicas y subclínicas en vacas, durante el periodo de lactación. Efectivo contra: Grampositivos (*Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma spp*, *Actinomyces spp*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium spp*), y Gram negativos (*Escherichia coli*, *Klebsiella*).

Dosis

Un aplicador por cada cuarto mamario afectado, cada 24 horas durante 3 días consecutivos. Período de retiro: Carne: 7 días; Leche: 3 días.

Presentaciones

Caja 12 unidad (es),

Vías Administración

Topical Intramamaria

Paises

Perú SENASA F.03.05.N.1168

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO

QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO

QJ51R COMBINACION DE ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO

QJ51RD Otros antibacterianos betalactámicos, combinaciones con otros antibacterianos

QJ51RD01 cefalexina, combinaciones con otros antibacterianos

Biomont,



Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)

B-lactamicos

Cefalosporinas

Sulfonamidas – trimetoprim

Vitaminas

Asociadas con medicamentos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/lactabien/>