

## LECHERIN® MAX

### Solución Inyectable



### Composición

Butafosfan 0.5 g  
Calcio, borogluconato 25 g  
Dextrosa 15 g  
Magnesio, cloruro 2 g

### Indicaciones

Está indicado en bovinos para el tratamiento y prevención de hipocalcemia puerperal (fiebre de leche, paresia puerperal o vaca caída). Deficiencias de calcio, fósforo, magnesio y glucosa en vacas post-parto y/o de alta producción.

Tratamiento de cetosis, intoxicaciones o envenenamientos.  
Reconstituyentes en casos de deficiencias y falta de energía.

### Dosis

500 mL por animal. Vía endovenosa inferior a 40 mL por minuto.  
En casos de hipocalcemia repetir dosis a las 6 o 12 horas,  
según recomendación del médico veterinario.

### Presentaciones

Frasco 500 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intravenoso

### Paises

Perú SENASA F.75.01.N.0116

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes  
Metabolismo y hepáticos  
Reconstituyentes

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/vitaminas/lecherin-max/>

Biomont,

