

ORALMEC PLUS

Tableta Oral



Composición

Ivermectina 2 mg
Praziquantel 50 mg

Indicaciones

Oralmec Plus, está indicado en caninos y felinos para el tratamiento y control de infestaciones por tenias, nemátodos gastrointestinales, nemátodos del corazón (forma juvenil), ácaros de la sarna, garrapatas, piojos chupadores; entre ellos: Tenias: Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum, Taenia multiceps, Taenia serialis, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Mesocestoides spp., Spirometra spp. Nemátodos gastrointestinales: Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Trichuris vulpis, Toxascaris leonina, Toxocara canis, catis, Stongyloides stercoralis, Uncinaria stenocephala, Capillaria aerophila, Capillaria plica y Capillaria feliscati. Nemátodos del Corazón: Forma juvenil (microfilaria) de Dirofilaria immitis. Ácaros de la Sarna: Demodex canis, Demodex cati (sarna demodéctica), Sarcoptes scabiei var. canis (sarna sarcóptica), Notoedres cati (sarna notoédrica), Otodectes cynotis (sarna otodéctica o sarna de la oreja). Piojos chupadores: Linognathus setosus. Garrapatas: Rhipicephalus sanguineus y Otobius megnini.

Dosis

1 tableta por cada 10 kg de peso del animal. En cachorros, dosificar a las 4, 8 y 12 semanas de edad (perros) y a las 6, 8 y 12 semanas de edad (gatos). En adultos, dosificar cada 3 meses. Dosificar a las hembras antes de la monta. En zonas de alta infestación por Echinococcus granulosus dosificar cada mes. Para el tratamiento de sarna, repetir cada 7 días por 7 a 9 semanas en sarna demodéctica y cada 7 días por 3 a 4 semanas en sarna sarcóptica, notoédrica y otodéctica. No requiere período de retiro.

Presentaciones

Frasco 60 unidad (es),

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.04.N.200

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Tenias (cestodos)
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Garrapatas
Piojos

Biomont,

