

PLASMOL® DORADO

Solución Inyectable



Composición

Diminaceno, aceturato 7 g
Metamizol, sódico 3.5 g
Oxitetraciclina, clorhidrato 37 g

Indicaciones

Está indicado para el control y tratamiento de hemoparásitos que causan anaplasmosis, piroplasmosis o babesiosis y tripanosomiasis. La oxitetraciclina ejerce un potente control en el tratamiento de Anaplasmosis, al actuar sobre Anaplasma marginale, Anaplasma centrale, Anaplasma ovis. Diminazeno diaceturato es muy efectivo en casos de piroplasmosis pues ejerce poderosa acción sobre Babesia bigemina, babesia bovis, Babesia caballi, Babesia canis, Babesia divergens, Babesia equi, Babesia gibsoni, Babesia motasi, Babesia ovis y Babesia perroncitoti. Así mismo su amplio espectro de acción permite usarlo con éxito en casos de Tripanosomiasis, por ser muy eficaz contra Tripanosoma brucei, Tripanosoma equiperdum, Tripanosoma evansi, Tripanosoma vivax, Tripanosoma congolense. Metamizol sódico ejerce un efecto antipirético, lo que constituye un alivio sintomático inmediato que favorece la recuperación del animal.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y caninos: 1 mL por cada 10 kg de p.v. Dosis única y puede aplicarse nuevamente después de las 24 horas, si la fiebre persiste. En casos de Anaplasmosis: 1.5 mL por cada 10 kg p.v. administrar por 3 días, cada 24 horas. Período de retiro Carne: 28 días Leche: No administrar a hembras en lactación.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Perú SENASA F.03.01.N.0569

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Analgésicos y antipiréticos
Antiinflamatorios
No esteroideos sistémicos
Antiparasitarios Internos
Antiprotozoarios
Anaplasma y coadyuvantes
Babesia
Tripanosoma

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/plasmol-dorado/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

