

## SECABIEN®

Suspensión Intramamaria



### Composición

Ampicilina, trihidratada 1 g  
Cloxacilina benzatínica 7 g  
Vitamina A 100000 U.I.

### Indicaciones

Secabien esta indicado para mastitis subclínicas y como preventivo de mastitis en vacas al inicio del periodo de secado. Efectivo contra *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus pyogenes*, *Staphylococcus intermedius*, *Mycoplasma bovis*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium spp.*

### Dosis

Dosis: Un aplicador por cada cuarto mamario antes del inicio del periodo de secado. Período de Retiro: Carne: 28 días; Leche: 4 días después del parto. Aplicar con un mínimo de 30 días pre parto.

### Presentaciones

Jeringa 10 g, Caja 4 unidad (es),

### Vías Administración

Topical Intramamaria

### Países

Perú SENASA F.03.05.N.1166

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO  
QJ51C BETA-LACTAMICOS ANTIBACTERIANOS, PENICILINAS, PARA USO INTRAMAMARIO  
QJ51CF Penicilinas resistentes a la beta-lactamasa  
QJ51CF02 cloxacilina

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
B-lactámicos  
Penicilinas  
Vitaminas  
Asociadas con medicamentos

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/secabien/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

