

SECABIEN®

Suspensión Intramamaria



Composición

Ampicilina, trihidratada 1 g
Cloxacilina benzatínica 7 g
Vitamina A 100000 U.I.

Indicaciones

Secabien está indicado para mastitis subclínicas y como preventivo de mastitis en vacas al inicio del periodo de secado. Efectivo contra Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus intermedius, Mycoplasma bovis, Corynebacterium pyogenes, Clostridium spp.

Dosis

Dosis: Un aplicador por cada cuarto mamario antes del inicio del periodo de secado. Período de Retiro: Carne: 28 días; Leche: 4 días después del parto. Aplicar con un mínimo de 30 días pre parto.

Presentaciones

Jeringa 10 g, Caja 4 unidad (es),

Vías Administración

Topical Intramamaria

Paises

Perú SENASA F.03.05.N.1166

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO
QJ51C BETA-LACTAMICOS ANTIBACTERIANOS, PENICILINAS, PARA USO INTRAMAMARIO
QJ51CF Penicilinas resistentes a la beta-lactamasa
QJ51CF02 cloxacilina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
B-lactamicos
Penicilinas
Vitaminas
Asociadas con medicamentos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/secabien/>

Biomont,

