SULFAQUINOXALINA® SULFAMONT

Biomont,

Solución Oral



Composición

Sulfaquinoxalina 3.4 g
Vitamina K3 (Menadiona) 215 mg

Indicaciones

Está indicado para la prevención y tratamiento de coccidiosis intestinal de aves, coccidiosis intestinal y hepática de conejos causadas principalmente por Eimeria sp.; y de las enteritis causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas como Pasteurella multocida (cólera aviar), Salmonella sp.

Dosis

Coccidiosis en aves: Prevención: Administrar 10 mL en 3.5 L de agua de bebida durante 2 días. Tratamiento: Administrar 40 mL en 3.5 L de agua de bedida durante 3 días, suspender por 2 días y luego administrar 30 mL en 3.5 L de agua de bebida durante 3 días. Cólera aviar: Prevención:Administrar 5 mL en 3.5 L de agua de bebida Tratamiento: Administrar 30 mL en 3.5 L de agua de bedida durante 5 días. Coccidiosis en conejos: 1 mL en el agua de bebida por conejo durante 3 días, suspender 2 días y continuar por 3 días. Período de Retiro: 10 días.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.21.02.N.0024

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Sulfonamidas – trimetoprim
Antiparasitarios Internos
Antiprotozoarios
Coccidia
Vitaminas
Asociadas con medicamentos

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/sulfaquinoxalina/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com